

INTERPRETACIÓN DE LOS PROVERBIOS POR SUJETOS DE EDAD AVANZADA CON ENFERMEDAD DE ALZHEIMER LEVE.

Autora principal: Elisandra Villela Gasparetto

Coautora: E. M. Morato

Objetivo: Estudiar la importancia de los procesos en la interpretación y el uso de proverbios de exposición con una probable enfermedad leve de Alzheimer. **Método:** La investigación empírica y cualitativa con 10 sujetos mayores de 60 años evaluados en la Clínica de Psiquiatría Geriátrica, Hospital - Unicamp, diagnosticado por el médico y el DSM-IV. También había un grupo control de 10 sujetos sanos con el mismo perfil sociolingüístico. Los datos fueron recolectados a través de un Memorando de Proverbios se compone de 10 refranes con más significados metafóricos y 10 menos metafórica. El procedimiento consistió en la presentación de cada uno de los proverbios por vía oral: "¿Qué quiere decir este proverbio?" y luego pedir el sujetos "imaginar una situación contextual en el que se utilice este proverbio." Los datos fueron grabadas y transcritas para su análisis. **Resultados:** El análisis consideró la comparación de los dos grupos en relación con el trabajo cognitivo-lingüísticos necesarios en el manejo de dichos enunciativa. **Conclusión:** Esta investigación es relevante para describir el proceso involucrado en el sentido cognitivo-lingüísticas, la construcción de formas indirectas para entender mejor la naturaleza socio-cognitiva del lenguaje en la demencia.

"PERCEPCIÓN DE CAMBIO TRAS LA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN LOS PACIENTES ENFERMOS DE ALZHEIMER"

Autora principal: Alina Campos Puente.

Coautores: M. Borda Mas, A. M. López Jiménez, M. L. Avargues Navarro.

El Alzheimer es una devastadora enfermedad que implica un deterioro neuronal progresivo e irreversible, demandando un abordaje terapéutico multidisciplinar.

Con el objetivo de comprobar la eficacia de un Programa de Psicoestimulación, se realizó un estudio longitudinal con un seguimiento de seis meses. La muestra está constituida por 35 enfermos de la Asociación Utrerana de Familiares de Enfermos de Alzheimer "Nuestra Señora del Consuelo", en Sevilla, 27 mujeres (77,14%) y 8 hombres (22,8%), con una media de edad de 77 años. Los instrumentos utilizados fueron: Entrevista a familiares y Observación sistemática - estructurada, elaboradas al efecto, Mini Mental State Examination (MMSE), Set - Test, Test del Informador (IQCODE), Índice de Barthel (AVD), Escala de Valoración Física de Barthel, Escala de Lawton y Brody (PGC-IADL). Para el análisis de datos se utilizó el programa estadístico SPSS 18.0. Se calculó el Índice de Puntuación de Cambio Preciso (PCP) para determinar la evolución intrasujeto, y comparaciones de medias para valorar la evolución grupal.

Se comprobó que más del 50% de los participantes en el programa mejoraron o mantuvieron el mismo estado en el área cognitiva, manteniendo su estado o empeorando en el área funcional y conductual. El 34,29% (12) de los participantes, en la actualidad aún pueden recibir las diferentes terapias de que consta el Programa. Podemos concluir, que dicho programa ha tenido una repercusión positiva en la calidad de vida de los enfermos, aunque destacamos la necesidad de un diagnóstico precoz para aumentar la efectividad de la intervención psicológica como tratamiento no farmacológico.

PREVALENCIA DEL SÍNDROME DEMENCIAL Y ENFERMEDAD DE ALZHEIMER EN DOS POLICLÍNICOS DE LA LISA. 2008-2009.

Autora principal: Dra. MSc. Lidia Rodríguez Blanco.

Coautores: G. V. Luberta Noy, O. Sotolongo Arró

Las Demencias constituyen un importante problema de salud en países con alta expectativa de vida entre los que se encuentra Cuba. La enfermedad de Alzheimer ocupa más del 50% de todas las demencias y se estima que cien mil personas padecen de enfermedad de Alzheimer o demencia relacionada. El objetivo del trabajo fue estimar la Prevalencia del Síndrome Demencial y la Enfermedad de Alzheimer e Identificar el compartimiento de los diferentes tipos de demencia, en relación con las variables seleccionadas en la población mayor de 60 años atendida por dos Policlínicos de La Lisa. Se hizo un estudio descriptivo y prospectivo de corte longitudinal a 846 adultos de 60 y más años de edad entre julio del 2008 a enero de 2009. El universo fue de 7977. A los pacientes seleccionados se les realizaron encuestas, se les aplicaron diferentes test neuropsicológicos: el test de Folstein, CDR, así como el Haschinski y Ninds Airen. El tratamiento de los datos se realizó empleando una base de datos (EPINFO-6.02) y se estimó la prevalencia así como otras medidas como frecuencias absolutas, porcentajes, Chi cuadrado. Resultados: El Síndrome Demencial tuvo una prevalencia de 11.8 %, El Alzheimer ocupó el 63%, de todas las Demencias, la mayor afectación fue a partir de los 80 años de edad, el sexo femenino fue el más dañado, hubo una relación inversamente proporcional de la entidad con el grado de escolaridad, los pacientes sin vínculo conyugal predominaron tanto en el Síndrome como en la Enfermedad, la HTA y Cardiopatía Isquémica fueron las enfermedades más asociadas, el desinterés sexual fue la manifestación sexual más relevante. Conclusión. El Síndrome Demencial y La Enfermedad de Alzheimer constituyen en nuestro municipio un importante problema de salud en ascenso.

VIOLENCIA FAMILIAR EN CUIDADORES PRINCIPALES DE PACIENTES CON DEMENCIA TIPO ALZHEIMER.

Autora principal: Lic. MSC. Gladys Victoria Luberta Noy.

Coautores: L. Rodríguez Blanco, O. Sotolongo Arró

Con el objetivo de explorar los principales problemas médicos, sociales, laborales y económicos de los que presentan el síndrome del "cuidador", en una población determinada, podemos considerar como cierto, que el "cuidador" del paciente con enfermedad de Alzheimer, formulado por algunos autores, como un paciente oculto o desconocido, es corroborado en nuestra investigación.

Para la obtención de la información se utilizó una encuesta, con aplicación directa de forma individual confeccionada para los efectos, que recogió diferentes variables tales como: frecuencia de aparición de alteraciones médicas, físicas, psíquicas y su relación con el grado de parentesco, así como los principales problemas sociales, laborales, económicos que enfrenta el "cuidador" en su labor diaria; se arribó a la conclusión de que el "cuidador" sufre de diversas alteraciones personales, psíquicas, sociales y físicas, que repercuten en su vida personal con implicación familiar, situación que puede llevarlo a convertirse en un enfermo.

VIOLENCIA Y DEMENCIA EN UN ÁREA DE SALUD. POLICLÍNICO CRISTÓBAL LABRA. LISA. 2010

Autora principal: Dra. MSc. Ana Lidia Rodríguez Blanco

Coautores: G. V. Luberta Noy

Con el objetivo de explorar los principales problemas médicos, sociales, laborales y económicos de los que presentan el síndrome del "cuidador", en una población determinada, podemos considerar como cierto, que el "cuidador" del paciente con enfermedad de Alzheimer, formulado por algunos autores, como un paciente oculto o desconocido, es corroborado en nuestra investigación.

Para la obtención de la información se utilizó una encuesta, con aplicación directa de forma individual confeccionada para los efectos, que recogió diferentes variables tales como: frecuencia de aparición de alteraciones médicas, físicas, psíquicas y su relación con el grado de parentesco, así como los principales problemas sociales, laborales, económicos que enfrenta el "cuidador" en su labor diaria; se arribó a la conclusión de que el "cuidador" sufre de diversas alteraciones personales, psíquicas, sociales y físicas, que repercuten en su vida personal con implicación familiar, situación que puede llevarlo a convertirse en un enfermo.

MORBILIDAD DEL PACIENTE CON DEMENCIA EN UN SERVICIO GERIÁTRICO.

Autora principal: MSc. Dra. Sira Maria Cabrera Iglesias.

Coautores: L. Porto Franco, O. Chacón Borrero

Se realizó un estudio observacional descriptivo con el objetivo de determinar la morbilidad del paciente con demencia en el servicio de geriatría del Hospital Provincial "Amalia Simoni" de Camagüey durante el 2010. Como objetivos específicos se plantearon distribuir los pacientes según grupos de edades, sexo y convivencia; determinar estadio de la demencia y capacidad funcional del paciente; identificar los antecedentes patológicos personales, diagnósticos al ingreso y tipo de complicaciones desarrolladas. El universo estuvo constituido por la totalidad de los pacientes que ingresaron en el periodo señalado, con diagnóstico de Demencia de cualquier etiología, la fuente primaria de los datos fueron las historias clínicas y la información se vació en un formulario creado según interés de la investigación, los datos se codificaron manualmente y se procesaron por medios automatizados. Los principales resultados fueron: predominio de ancianos de la tercera edad (56.7%), sexo femenino (48.9%) y de los que viven con los hijos (66.0%); los estadios 2 y 3 de la demencia fueron los más frecuentes (48.7% y 35.9%) así como los dependientes para actividades instrumentadas y no instrumentadas de la vida diaria; siendo la Hipertensión Arterial (45.8%) el antecedente patológico más observado, las enfermedades cardiovasculares (86.9%) el motivo de ingreso más usual y la bronconeumonía hipostática la complicación más reportada (46.6%). Se concluyó que a pesar del desarrollo de la geriatría aún persisten altos reportes de complicaciones y poco conocimiento por parte de los cuidadores en su manejo, lo que atenta contra la calidad de vida de estos pacientes.